

FALE CONNOSCO

Serviço de Terapia Celular +351 225 084 000

Equipa de Enfermagem (até às 16h00) 5322
eestc@ipoporto.min-saude.pt

Equipa Médica (até às 19h00):

Ana Salselas | 7268
ana.salselas@ipoporto.min-saude.pt

Sara Lopes | 7999
sara.b.lopes@ipoporto.min-saude.pt

Lúcia Vieira | 7168
lucia.m.vieira@ipoporto.min-saude.pt

Assistência após as 19h00: 225 084 000
(Solicitar transferência para o médico de urgência da
Unidade de Transplantação de Medula Óssea)

MOBILIZAÇÃO
COM
PLERIXAFOR

SERVIÇO DE
TERAPIA CELULAR



IPOPORTO

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FG, EPE

Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto

www.ipoporto.pt

Versão 1 | janeiro 2024



IPOPORTO

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FG, EPE

Para cuidar **de si!**

O QUE É O PLERIXAFOR

É um fármaco injetável mobilizador de células progenitoras hematopoiéticas.

PARA QUE SERVE

O Plerixafor é indicado, em combinação com o fator de crescimento G-CSF, **para potenciar a mobilização de células progenitoras hematopoiéticas para o sangue periférico**, em situações de colheita e subsequente transplante autólogo.

Normalmente, é administrado:

▶ Preventivamente, quando a contagem de células progenitoras hematopoiéticas circulantes no dia previsto da colheita se espera ser insuficiente em relação à quantidade desejada, após adequada mobilização com G-CSF (com ou sem quimioterapia),

OU;

▶ Ao doente que tiver de fazer segunda mobilização, por anterior colheita não ter atingido o valor de células suficientes.

COMO É ADMINISTRADO

- ▶ O Plerixafor deve ser administrado cerca das 22h00 (aproximadamente 11 horas antes da aférese).
- ▶ É administrado por enfermeiro, sob vigilância do médico (na Unidade de Transplantação de Medula Óssea - em regime de ambulatório ou no serviço onde estiver internado).
- ▶ Após a administração deve permanecer cerca de uma hora em vigilância.

Nota: Deve vir sempre acompanhado.

Observações:

Tem de estar no IPO Porto às 21h30 do dia ____/____/____.

O QUE PODERÁ SENTIR APÓS A ADMINISTRAÇÃO

- ▶ Distúrbios gastrointestinais: diarreia, náuseas, vômitos, flatulência e/ou dor abdominal;
- ▶ Reações no local da injeção: prurido e/ou erupção cutânea;
- ▶ Outras possíveis reações adversas: urticária, inchaço periorbital e/ou falta de ar.

Sempre que surgir qualquer uma das situações descritas deve comunicar a um profissional de saúde.